

# Die Verbreitung der fünf Singzikaden-Arten in Österreich (Hemiptera: Cicadoidea)<sup>1</sup>

W. SCHEDL

## Abstract

The distribution of five singing cicada species in Austria (Hemiptera: Cicadoidea).

A comprehensive survey of the 5 cicada species living in Austria and adjacent countries is given as far as localities are not yet published. But the 5 distribution maps show all known localities of the Cicadidae species *Lyristes plebeius* (SCOP.), *Cicada orni* L. and the three Tibicinidae *Tibicina haematodes* (SCOP.), *Cicadetta montana* (SCOP.) and *Cicadivetta tibialis* (PANZ.). A wide distribution in Austria is known of *C. montana* north and south of the central Alps. *L. plebeius* has been missed since hundred years. *T. haematodes* was found for the first time in the federal country of Burgenland. Localities of all five species in Austria refer to xerothermic habitats, which have more or less relict characters. Migration or expansion of cicada populations were not observed.

<sup>1</sup> Herrn Univ.-Prof. Dr. Hubert Pschorn-Walcher gewidmet zum 75. Geburtstag (18.10.2001).

## Einleitung

Ein vorläufiges Verzeichnis aller Zikaden-Arten Mitteleuropas ist 1997 erschienen (HOLZINGER et al. 1997), für Österreich gibt es ein solches Verzeichnis durch HOLZINGER (1996).

Wie sieht es nun mit den „Singzikaden“ Österreichs aus? Seit meiner Arbeit vom Jahr

1973 ist die Kenntnis über das Vorkommen von Singzikaden in Österreich und angrenzender Gebiete maßgeblich erweitert worden. Der Zuwachs an Fundorten ist durch Streufunde von einer Reihe von Entomologen erfolgt, aber auch nach Durchsicht weiterer Sammlungen aus privaten und öffentlichen Stellen sowie durch eigene Aufsammlungen und Beobachtungen. Das in SCHEDL (1973) zitierte regionale Schrifttum wurde hier versucht möglichst vollständig nochmals in Erinnerung zu bringen, wenn die Einzelzitate aus Platzgründen auch nicht mehr bei den Arten angeführt wurden.

Bei den fünf in Österreich nachgewiesenen Arten handelt es sich um die Cicadidae *Lyrister plebeius* (SCOP.) und *Cicada orni* L. und die Tibicinidae *Tibicina haematodes* (SCOP.), *Cicadetta montana* (SCOP.) und *Cicadivetta tibialis* (PANZ.). Unklarheit besteht noch, welche Unterarten der Bergsingzikade in Österreich präsent sind. *Tibicina haematodes* konnte für das Burgenland erstmals nachgewiesen werden. Bei den Verbreitungskarten kann ein Symbol auch für zwei oder mehrere Fundorte gelten, die nahe beisammen liegen.

## Abkürzungen

HNS .....	Haus der Natur Salzburg
MTKD .....	Museum für Tierkunde Dresden
NHMW .....	Naturhistorisches Museum Wien
OÖLML .....	Biologiezentrum des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz
STLM .....	Joanneum, Landesmuseum für Steiermark, Graz
STMNST .....	Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart
ZSTSM .....	Zoologische Staatssammlung München

## Material

### Cicadidae

*Lyrister plebeius* (SCOPOLI 1763):  
Gemeine Singzikade (Karte 1, Foto 1)

Fundorte siehe SCHEDL (1973), neu hinzugekommen sind nur wenige Funddaten außerhalb Österreichs:

Südtirol: 1♂ Val Venosta (Vintschgau), 20.7.1927, leg. Perini (Trient), ex Coll. Forcher-Mayr (Bozen) in Coll. B. Bosin, det. W. Sch. 1988; 1♂ Bozen, Sandelberg (Guntschna), 13.7.1986, leg. et in Coll. B. Bosin, det. W. Sch. 1988.

Karte 1:  
Verbreitung von *Lyrister plebeius* (SCOPOLI 1763) in Österreich und angrenzenden Ländern.




Foto 1:  
*Lyrister plebeius* (SCOP.)

**Trentino:** 1♀ Monte Brione bei Riva, lebend 23.6.1973, leg. Smeets, in Coll. et det. W. Sch. 1973; 1 Exuvie ♀ Terlago bei Trient, 14.7.1985, leg. et in Coll. B. Bosin, det. W. Sch. 1988.

Bionomie, Ökologie und Gesamtverbreitung siehe SCHEDL (1973, 1986, 2000).

### ***Cicada orni* LINNAEUS 1758: (Manna-) Eschenzikade (Karte 2, Foto 2)**

Fundorte siehe SCHEDL (1973), weitere Funddaten stammen von: Steiermark: 2 Ex. Umgebung Bad Gleichenberg, Gleichenberger Kogel, 400-470m, SW exponierter Hang mit Traubeneichen, 25.6. und 24.7.1993 (schon Juni/Juli 1992 singend gehört), leg. durch mehrere Gewährsmänner et in Coll. W. Holzinger (persönl. Mitteilung 6.11.93 und HOLZINGER 1995, 1996b), ca zwei Jahre später besuchte der Verfasser die Fundstelle und hörte eindeutig dort die Membrantöne dieser Art. Es handelt sich um einen Erstnachweis in der heutigen Steiermark!

**Südtirol:** 1♀ Bozen, Hörtenberg, oberhalb Peter Ploner, 28.7.1984, 1 Ex. Bozen, Oswaldleiten, 3.8.1991, alle leg. et in Coll. B. Bosin, det. W. Sch. 1988, zahlreiche ♂♂ gehört oberhalb Kastelbell, Unter-Vinschgau, 550-600m, am Waalweg bei Algund-Gratsch-St. Peter, 690m, zwischen Nals und Andria am Hang, bei Sigmundskron, zwischen Auer und Leifers und zwischen Bozen-Ost und Klausen, 18.-19.7.1991, vom Verf. im Etschtal zwischen Branzoll, Mitterberg, Pfatten und Kaltern mehrfach gehört und gesehen an Mannaeschen (Hellrigl, in litt. 10.6.1991).

**Trentino:** 1♂ Materello bei Trient, August 1926, leg. Perini (Trient), ex Coll. Forcher-Mayr, in Coll. B. Bosin, det. W. Sch. 1988

Bionomie, Ökologie und Gesamtverbreitung siehe SCHEDL (1973, 1986, 2000).

### **Tibicinidae**

#### ***Tibicina haematodes* (SCOPOLI 1763): Blutrote Zikade oder Lauer (Karte 3, Foto 3)**

Fundorte siehe SCHEDL (1973), weitere Funddaten können inzwischen angegeben werden:


**Niederösterreich und Wien:** 1♂ Hermank. (=Hermanskogel, 540m, südl. Wienerwald), 3.10.1920 und 1♀ Hermanskogel, Wurzen, 29.6.1924, 1♀ Leopoldsberg (Nase), Wien, 28.5.1948, alle in Coll. NHMW, det. W. Sch. 2000; mehrfach nachgewiesen Leopoldsberg, Nasenweg, vom 17.6. bis 8.7.1992 (in litt. M. Steiner, 11.1.1993); 2 Exurien ♂♂ ebendort, 300 m, 30.5.2001, leg. et in Coll. P. Sehnal (NHMW), det. W. Sch. 2001; 1m Haschberg bei Klosterneuburg,

11.7.1964, leg. H. Malicky; det. W. Sch. 1974; 1 Exuvie ♀ Kritzendorf, NÖ, 17.6.1991, leg. et in Coll. H.M. Steiner (Wien), det. W. Sch. 1992; ♂♂ singend ebendort (ehemaliger Weingarten) angetroffen vom 17.6.1. bis 7.1991 (in litt. M. Steiner 11.1.1993); 1♀ Klosterneuburg, 13.6.1959, leg. R. Bruckner, in Coll. A. Kofler, det. W. Sch. 1988.

**Burgenland:** 1♀ oberhalb Neusiedl am See, 25.6.1979, 1 Nympe (in Alkohol) ebendort, unter Stein im Gang, 11.5.1979, beide leg. Probst, det. et in Coll. W. Sch., 1 Exuvie NW von Neusiedl, 130m,

#### **Karte 2:**

**Verbreitung von *Cicada orni* LINNAEUS 1758 in Österreich und angrenzenden Ländern.**



**Foto 2:**  
***Cicada orni* L.**




21.5.1983, leg. C. Hibernik, in Coll. et det. W. Sch.  
Alle diese Funddaten sind Erstnachweise dieser Art für  
das Burgenland!

Südtirol: je 1♂ Bozen, Hörtenberg bzw. Oswaldleiten,  
15.7.1980, leg. in Coll. B. Bosin (in litt. Sept. 1991).

Trentino: 1♀ Sarnagna bei Trient, Juni 1935, leg.  
Perini (Trient), ex Coll. Forcher-Mayr (Bozen) in Coll.  
B. Bosin, det. W. Sch. 1988; 1♀ Monte Maderno,  
Gardasee, 10.7.1964, leg. K. Burmann, in Coll.  
OÖLML, det. W. Sch. 1993.

**Karte 3:**  
**Verbreitung von *Tibicina haematodes***  
**(Scopoli 1763) in Österreich und**  
**angrenzenden Ländern.**



**Foto 3:**  
***Tibicina haema-***  
***todes* (Scop.)**

Ungarn: 1 Exuvie Ungarn, Karad, SE-Plattensee,  
9.VIII.1988, an *Fagus sylvatica*, im Buchensteigerwald,  
leg. G. Lehmann, in Coll. et det. W. Sch. 1989.

Bionomie, Ökologie und Gesamtverbrei-  
tung siehe SCHEDL (1973, 1986, 2000).

***Cicadetta montana* (SCOPOLI 1772):**  
**Bergsingzikade, in Tirol auch „Tschig-**  
**galle“ genannt (MADER (1922))**  
**(Karte 4, Foto 4)**

Der Status der Existenz von eventuellen  
Unterarten der Bergsingzikade in Österreich  
ist in der derzeitigen Auffassung des Verf.  
noch so ungeklärt, daß auf diese Subspecies  
nicht eingegangen wird. *Cicadetta megerlei*  
FIEBER, die z.B. in STROBL (1900) für je 1♀ von  
Graz bzw. Admont genannt wird, wird unter  
*C. montana* SCOPOLI eingeordnet. Es scheint  
derzeit so, daß unter *C. montana* SCOP. im  
Untersuchungsgebiet nur diese Spezies  
gemeint ist, die im männlichen Geschlecht im  
Sonagramm der Membrantöne eine langgezo-  
gene Lautfolge zeigt, wie diese in BOULARD  
(1995 p.55) publiziert wurde.

Fundorte: Umfangreiche Fundortangaben  
aus Österreich siehe SCHEDL (1973), wo auch  
Angaben von MAYR 1879, THEN u. LOW 1886,  
STROBL 1900, SABRANSKY 1912, WERNER  
1927, JAUS 1934, MOOSBRUGGER 1946,  
KUHNELT 1949 u. 1962, HAMANN 1960, RESSL  
1963, HANDEL-MAZZETTI 1964, JANETSCHKE  
1967, WAGNER & FRANZ 1961, SCHUSTER  
1961, 1964, HÖLZEL 1965, KOFER 1971 und  
KALTENBACH et al. 1972 eingebaut sind. Spä-  
ter sind zu diesem Thema z.B. THALER &  
SCHEDL 1992, SCHEDL 1994 und SCHEDL 2000  
erschienen.

Seitdem sind innerhalb von Österreich  
zahlreiche Fundnachweise dazugekommen.

Vorarlberg: 1 Exuvie ♀ Rankweil, Vlb., Gastra  
Wald, ca 500m, 13.6.1994, leg. Gächter, in Coll. et det.  
W. Sch. 1994.

Tirol: 1 Exuvie ♀ Nauders, (W-Tirol, 1395m), an  
Halmen, 23.5.1993, leg. et in Coll. A. Ortner, det.  
W. Sch. 1995; 1♀ Umg. Ried bei Landeck, Oberinntal,  
800m, 7-8.1939, Proock (leg.), in Coll. NHMW, det.  
W. Sch. 1993; 1 Ex. Unterberg, Umgebung Innsbruck,  
14.6.1949, leg. J. Ratter, in coll. A. Kofler (Lienz), 1♀  
Nordkette, Rauschbrunnen, 1000m, 1.6.1993, leg. K.  
Zehethofer, in Coll. W. Sch.; 1♀ Ambach, Örtztalein-  
gang, 3.6.1988, leg. et in Coll. W. Sch.; 1♀ Ötztal, Ebe-  
ne, 7.5.1964, 1♀ Hochzirl, 8.7.1962, 1♂ Zirl, 950m,  
1.6.1964, alle leg. Kapeller, in Coll. OÖLML Linz; 1 Ex.  
Mieminger Plateau, zwischen Locherboden und Telfs,  
24.6.1980, leg. J. Riedmann, in Coll. W. Luhan, det.

W. Sch.; 1♀ Grammat, Hoch-Innsbruck, 14.6.1973, leg. et in Coll. Hernegger; 1♀ Berg Isel, Innsbruck, 10.7.1976, leg. et in Coll. Hernegger; 1♀ Vomperbach, Nordkette, 25.5.1986, leg. Erlebach, in Coll. W. Sch.; 1 Exuvie im Gras, oberhalb Hinterbärenbad, Kaisertal, leg. Student, in Coll. W. Sch.; 1♂ singend, Kaisertal, östlich Boden-Alm, 900m, gehört von W. Sch.; 1♀ Böschung beim Pulverturm, Kufstein, 31.5.1924, leg. Prehn, in Heimatmuseum Kufstein (via Dr. G. Lehmann); 1♀ Stimmersee-Pulverturm, Unterinntal, 7.6.1986, leg. Mag. G. Lehmann, in Coll. et det. W. Sch.; 1♂ singend Leiblfling, Oberinntal, 2.6.1974 mündl. Mitt. W. Gstader; 1♂ Außersteinberg (zw. Steinberg u. Pinegg) Brandenbertal, 2.6.1979, 1♂ Kaisertal bei Kufstein, 24.7. 1980, 1♂ Felder südlich Barwies (Mieminger Plateau), 3.6.1979, 1♂ westlich Mötz (Oberinntal), 20.5.1981, 1♂ singend zwischen Steinberg und Brandenbertal, 1981, alle gehört von W. Gstader; 1♂ Exuvie Brandenberg, Hippurites-Riff, 28.6.1980, leg. et in Coll. Luhan, det. W. Sch.; 1♂ singend, Fließ, Oberinntal, 950m, 2.7.1974, gehört von W. Gstader; 1♀ Örtal Forchet, an Wegböschung nahe Inn und Autobahnzubringerstraße, 700m, leg. et in Coll. Gächter, det. W. Sch. 8.8.1991; 1-2♂♂ noch etwas SW davon, 720m, an *Pinus sylvestris* singend, 16.7.1991 (mündl. Mitteilung Gächter); 1♂ singend, Farst bei Umhausen, Örtal, 8.6.1995, leg. et in Coll. A. Ortner; 1 Exuvie Locherboden, Oberinntal, 16.5.1981, leg. et in Coll. Krewedl, det. W. Sch.; 1 Exuvie Kranebitten, oberhalb Bahndamm, 720m, 11.6.1983, leg. K. Burmann, 1♀ Eingang Halltal, Nordkette, 900m, Anfang 7.1976, leg. Nissler, in Coll. W. Sch.; 2♀♀ Milser Wald, Mils bei Hall, 700m, 29.6.1985, leg. E. Nissler, 1♀ in Coll. Nissler, 1♀ in Coll. W. Sch., det. W. Sch., 27.9.91; 1♀ Bschlabs, Lechtal, Nebental, 1100m, 26.6.1946, leg. Lechleitner, in Coll. W. Sch.; 1♀ Reutte, Stegerberg, 950m, 18.6.1992, leg. Inge Kahlen, det. et in Coll. W. Sch.; 1♀ Münster, (Unterinntal), 534m, 5.6.1999, leg. et in Coll. A. Ortner, det. W. Sch. 1999; 1♀ Innsbruck, 10.7.1954, leg. R.L. Loftus, in Coll. Inst. f. Zoologie, Univ. Innsbruck, det. W. Sch. 1991; 1♀ Namlos (Tirol, Lechtal), ohne weitere Angaben, det. W. Sch. 2000, in Coll. ZSTSM; 1♀ Zirl, Tirol, 22.6.1962, leg. A.W. Ebmer, det. W. Sch. 1991, in OOLML; 1♀ Fließ (Oberinntal), ca. 1000m, 26.6.2001, leg. et in Coll. K. Lechner, vid. W. Sch. 2001. Von der Umgebung von Natters und Mutters (südlich Innsbruck, ca. 750-850m) liegen dem Verf. umfangreiche Nachweise der Membrantöne der ♂♂ vor aus den Jahren 1977-88 mit Tages- und Temperaturangaben, die mir freundlicher Weise Kollege Mag. Walter Gstader schriftlich zur Verfügung stellte. Dabei steht aber die Bemerkung, daß seitdem die Bergsingzikaden nicht mehr zu hören sind. Auch der Verf. hat den Eindruck gewonnen, daß in den letzten 15 Jahren an den bekannten Stellen in N-Tirol *C. montana* kaum mehr nachweisbar ist.

**Salzburg:** 1♀ Glasenbach bei Salzburg, 26.6.1985, leg. et in Coll. M. Schwarz, det. W. Sch.; 1♀ Gaisberg, E Salzburg, 620m, 17.6.2000, leg. et in Coll. M. Schwarz, det. W. Sch. 2000; 1♂ Salzburg-Aigen, 7.6.1997, (leg.) M. Schwarz-Waubke, in Coll. et det. W. Sch. 1998; 1♀ St. Jakob/T., Flachgau, 28.4.(?) 1952, (leg.) F. Mairhuber, 1♀ Leogang, Bhf, 950m, 27.6.1983, leg. F. Mairhuber, 1♀ Parsch, an Gebüsch, 24.5.1959,

leg. Babiy, 1♀ Salzburg-Zistel, 1000m, 17.6.1966, B.P. Babiy leg., 1♀ Kritzenberg (1000m, NW Glanegg), 12.5.1948, (leg.) Babiy, 1♀ Heuberg, Hoch-Gottoreith, Mai 1935, leg. Schuller, 1♂ Glasenbach, Kamm, 1915, (leg.) L. Schuller, 1♀ Muhlstein (Berg SE Salzburg), 1000m, 14.5.1946, alle in Coll. HNS, det. W. Sch. 1994.

**Oberösterreich:** 1♀ Donauleiten W. Grafenau, südlich Niederkappel, 290m, 10.6.1993, leg. et in Coll. A. W. Ebmer, det. W. Sch. 1993; 1♂ samr Exuvie, Plan-Gebiet b. Leonstein, 29.5.1995, leg. Kleesall, in Coll.

#### Karte 4:

Verbreitung von *Cicadetta montana* (Scopoli 1772) in Österreich und angrenzenden Ländern.




Foto 4:

*Cicadetta montana* (Scop.) ♂

OÖLM Linz, det. W. Sch. 2001; 2QQ Pöstlingberg, Tabrigerwald, 31.5.1947, leg. F. Koller, 1Q Umgebung Linz, Ebelsberg, 27.5.1951, leg. H. Klimesch, beide det. W. Sch. 1991, und in Coll. OÖLML; 1Q Ebensee, Ob.österr., Coll. Heller, Coll. A. Jakobi, in MTKD, vidit W. Sch. 2001; 1Q Münzkirchen, OÖ., in Coll. W. Waitzbauer, det. W. Sch. 2001.

**Niederösterreich** und **Wien**: 1Q Wöllersdorf (unteres Piestingtal), 6.1954, leg. H. Malicky, und 2 Exuvien (QQ) Dümstein, Wachau, 27.5.1967, leg. H. Malicky, in Coll. et det. W. Sch. 1974; 1Q Prottes, 6 km NNE von Gänserndorf, 180m, Gemeindewald, 23.5.1986, leg. C. Wieser, in Coll. A. Kofler (Lienz), det. W. Schedl 2001; von ebendort 1Q vom 18.5.1986, 1Q vom 25.5.1986, leg. et in Coll. C. Wieser; 1Q Lainzer Tiergarten, Wien, 26.6.1970, leg. K. Hampel und 1Q Möllental (Höllental), 8.8.1967, N.Ö., leg. K. Hampel, beide in Coll. A. Kofler, Lienz, det. W. Sch.; 1Q und 1 Exuvie Q Dümstein, Wachau, 27.5.67, leg. H. Malicky, in Coll. et det. W. Sch. 1974; 1Q Schauboden, N.Ö., 3.7.1977, und 1Q Purgstall, N.Ö., 26.6.82, beide leg. E. Hüttinger, beide in Coll. et det. W. Sch.; 1 Exuvie Hochrieß, Bez. Scheibbs, Unternberg, an *Teucrium* sp., 12.7.1990, leg. F. Ressler, in Coll. et det. W. Sch. 1992; 1Q Purgstall, 1022, ohne Datum, leg. Ressler, und 1Q Perchtoldsdorf, 22.6.1948, beide in NHM Wien, det. W. Sch. 1993; 1 Exuvie Q, Wien 19, Himmelwiese, 9.6.2001, leg. Seyfert, in NHMW, det. W. Sch. 2001; 1Q Bisamberg, Wien, 27.5.1984, leg. Dollfuß (nahe C. *brevipennis* SCHUMACHER 1924), in NHMW, det. W. Sch. 2000; 1Q Weidling (N.Ö., 198m), 28.5.1948, 1Q Priesnitztal, (N.Ö.) 10.6.1934, 1Q Perchtoldsdorf, (N.Ö.), 22.5.1948, alle in NHMW, det. W. Sch. 1994; 1Q Gaming, (Kalkvorpalpen), Dreiechsberg, S-Hang, (ca 500m), 24.7.1980, leg. F. Ressler, in Coll. et det. W. Sch., 1995; 1Q Waidling bei Wien, Austria inferior, 30.5.1965, leg. Aspöck, det. W. Sch. 1991, in Coll. OÖLML; 1Q Hof, Leithageb. Umgebung, 10.6.1932, in Coll. HNS; 1Q Lunz, Niederösterreich, 8.6.39, 1Q Perchtoldsdorf, Heide, 18.5.1995, 1Q Wien Ug., alle in Coll. W. Waitzbauer, det. W. Sch. 2001.

**Burgenland**: 1Q Bruckneudorf (=Királybida), (160m), Mekely (leg.), 1.6.1911 (nach Soos 1956); 1Q Trausdorf (an der Wulka), N-Burgenland, 13.6.1975, leg. Hüttinger, det. W. Sch. 1991, in Coll. OÖLML.

**Steiermark**: 1Q Großreifling, Gesäuse, 6.1931, (leg.) L. Scheibling, ex Coll. Hanslmair (Wien), in Coll. et det. W. Sch.; 1 Exuvie Rohrbach a.d. Lafnitz, Bez. Hartberg, 450m, Trockenhang, März 1979, leg. C. Hribernik und K. Adlbauer (in litt. Adlbauer, 19.11.1980); 1Q Faßberg, NE Graz, 510m, 8.7.1962, leg. E. Kreissl, in Coll. STLM Graz, det. W. Sch. 1996; 1Q mit Exuvie, St. Peggau, N Stb, SE Lurgrotte, NW-Graz, 460-640m, 4.6.1994, H. Komposch leg., in Coll. W. Holzinger, det. W. Sch. 1996; 1Q Gleichenberg, Rudolfskogel, 400m, 1.6.1991, C. Franz & W. Paill leg., 1 Exuvie Q, ebendort, 15.7.1992, W. Holzinger leg., beide in Coll. Holzinger, det. W. Sch. 1996.

**Kärnten**: 1Q Waidisch, S-Kärnten, 24.-27.7.1967, U. Harde leg., und 1Q Rauth (Lesachtal), Kärnten, 19.7.1976, K. W. Harde leg., beide in StMNST, det. W. Sch. 4.8.93; 1Q Berg im Drautal, W-Kärnten, südlich vom Hubertusweg, 25.5.1997, leg. et in Coll. A. Kofler (in litt. 1.1.2001); 1Q Finkenstein, (S-Villach), 550m,

Trockenrasen-Eichen, 23.7.1992, leg. Komposch C., in Coll. W. Holzinger, det. W. Sch. 1996; 1Q Guttaring, Giffler, 800m, 22.6.1975, det. W. Sch. 1991, in Coll. OÖLML.

Dazu kommen noch Funddaten aus den angrenzenden Ländern, die in SCHEDL (1973) noch nicht publiziert wurden:

**Südtirol**: 1Q Mendelpaß, 1995, in Coll. LMS Graz, det. W. Sch. 1988; 1Q Aldein (Eggental, 1225m), 7. 1963, leg. R. Schmidt, in Coll. OÖLML; 2QQ Mitterberg (Überetsch), ca 400m, in Lichtfalle, 12. und 14.7.1991, leg. et in Coll. W. Schwienbacher, det. W. Sch. 1991; 2QQ (2QQ singend) Noaner Weiher, Jenesien, 1200m, leg. T. Kopf u. E. Gächter, in Coll. Gächter, 1Q in Coll. W. Sch., beide det. W. Sch. 1991; 1Q Vahmer See, NW von Brixen, ca 800m, 24.6.1950, (leg.) Peez, in Coll. Hellrigl, det. W. Sch. 1991; 1 Exuvie, Virgil-Schilmental bei Bozen, 500m, 5.6.1993, leg. B. Bosin, in Coll. et det. W. Sch. 1993; 1Q Bozen, Kompenner Weg, 6.7.1990, leg. et in Coll. B. Bosin, det. W. Sch. 1991.

**Trentino**: 1 Exuvie Q Terlago, NW von Trient, 457m, A Juli 1980, leg. B. Bosin in Coll. et det. W. Sch. 1991; 1Q Lago di Loppio, 11.7.1958, Lindner leg., Dlabola det. 1960, 1Q Vetriolo, Trent., 12.7.1955, leg. W. Epping, beide det. Dlabola 1960, vidit W. Sch. 1993, beide in Coll. STMNST.

**Süd-Bayern**: 1Q Leitzachtal, Bayer. Alpen, 5.6.1946, leg. Gettinger, 1 Exuvie Q Eining a. D. (SW Regensburg), Bayern, 28.5.1937, leg. Stöckert, 1Q 1 Exuvie Q Thaldorf (?), Bayern, 8.6.1938, leg. Stöckert, alle in Coll. ZSTSM, alle det. W. Sch. 1973; 2QQ München, 11 31' 48 2', 4.-5.7.1958, leg. R.L. Loftus, in Coll. Inst. f. Zoologie, Univ. Innsbruck, det. W. Sch. 1991; 1Q Gmund (beim Tegernsee), S-Bayern, (am Mangfall, (725m), 5.5.1945, 2QQ Leitzachtal bei Miesbach, Südbayern, 7.5. bzw. 20.5.1948, leg. J. Wolfsberger, 1Q Starnberg, 11.6.1925, Stöckert (leg.), alle det. W. Sch. 2000, alle in ZSTSM; 1Q Tal d. Schw. Laaber, Haus Werdenfels, 6.1960, (leg.) Necker, det. W. Sch. 1988, in ZSTSM; 1Q Sauz (?), Donauwörth, 10.6.1952, HNS, det. W. Sch. 1994.-Siehe auch SCHÖNITZER & OESTERLING (1998).

**Italien**: 1 Ex. Raibl, in Kärnten, leg. Then, seit 1918 bei Friaul / Italien (PROHASKA 1923).

Bionomie, Ökologie und Gesamtverbreitung siehe SCHEDL (1973, 1986, 2000).

### ***Cicadivetta tibialis* (PANZER 1788): Kleine Singzikade (Karte 5, Foto 5)**

Fundorte siehe SCHEDL (1973), seitdem sind innerhalb und außerhalb von Österreich folgende Fundnachweise dazugekommen:

**Niederösterreich** und **Wien**: 1Q Leopoldsberg, J. Redtb., Juni 1891, 1Q Wien, Umgebung, Dr. Knirsch lg., 1Q Bisamberg, alle in Coll. OÖLML, det. W. Sch. 1993; 2QQ Gumpoldskirchen, Kalvarienberg, 5.7.1940, 3QQ Leopoldsberg, Südhang, Wien, 2 St. 10.6.1953, 1 St. 26.7.1951, alle in Coll. NHMW, det. W. Sch. 1994. 1 Ex. Leopoldsberg, Wien, 1.7.1967, leg. Karl Hampel, in Coll. A. Kofler, det. Dlabola; 1Q Leo-



poldsberg, Südhg., 10.6.53, 1♂ Enzersdorf i. Thale, A.i., [leg.] Machatschek, beide det. W. Sch. 2001.

**Trentino:** ? Ex. Torri di Benaco, Lago di Garda, 15-20 giugno 1940, leg. Hartig, det. W. Wagner (CASTELANI 1952); 1♀ Alto Maderno, Gardasee, 10.7.1964, leg. Burmann, in Coll. ÖÖLML, det. W. Sch. 1993.

**Ungarn:** 1♀ Siebold (leg.); 2♂♂ Hungaria-Ungarn, Plattensee, Balatonfüred, 6.-11.V.82, leg. U. Hofmann, det. W. Sch. 2000, alle in Coll. ZSTSM.

Bionomie, Ökologie und Gesamtverbreitung siehe SCHEDL (1973, 1986, 2000).

## Diskussion


Alle Fundortangaben der genannten Singzikaden-Arten in Österreich und angrenzenden Ländern geben mehr oder weniger xerotherme Standorte an. Unsere Singzikaden-Arten sind somit Bioindikatoren für Wärme-standorte, die dem menschlichen Einfluß noch halbwegs Stand gehalten haben. Eine Reihe von Fundangaben sind nur mehr historisch, weil durch die verschiedenen anthropogenen Maßnahmen den Singzikaden ihre Lebensmöglichkeiten genommen wurden. *Cicadetta montana* ist euroasiatisch verbreitet, die übrigen alle ± mediterraner Herkunft. Viele Habitate der Singzikaden, außer von *C. montana*, sind als Relikareale anzusprechen. Von *Lyrister plebeius* fehlen in Österreich Nachweise seit über 100 Jahren (siehe WAGNER & FRANZ 1961).

## Danksagung

Für die Zurverfügungstellung von Funddaten bin ich dankbar den Herren Dr. Karl Adlbauer (Graz), Bruno Bosin (†) (Bozen), Dr. Karl Burmann (†) (Innsbruck), Pater A.W. Ebmer (Puchenau), Dipl.-Vw. S. Erlebach (Innsbruck), Mag. E. Gächter (Innsbruck), Prof. Mag. Walter Gstader (Mutters, Tirol), Dr. Klaus Hellrigl (Brixen), Dr. Werner Holzinger (Graz), Manfred Kahlen (Hall i. T.), Prof. Dr. Alois Kofler (Lienz), Prof. Dr. Günther Krewedl (Kematen, Tirol), Prof. Dr. Gerhard Lehmann (Kufstein), Prof. Mag. Wolfgang Luhan (Innsbruck), Univ.-Prof. Dr. Hans Malicky (Lunz, NÖ), Eduard Nissler (Hall i. T.), Johann Probst (Wien), Dipl.-Biol. Alois Ortner (Stans), Prof. Franz Ressler (Purgstall, NÖ), Dr. Martin Schwarz (Kirchschlag,

O.Ö.) und Prof. Dr. W. Schwenbacher (Auer, S-Tirol), Mag. Peter Schnal (Wien), Univ.-Prof. Dr. Martin M. Steiner (Wien), Prof. Dr. W. Waitzbauer (Wien), Dr. Christian Wieser (Pischeldorf, Kärnten) und Dr. Herbert Zettel (Wien). Herrn Univ.-Prof. Dr. Konrad Thaler danke ich für die Möglichkeit, seine entwickelte Österreich-Karte hier für meine Verbreitungsangaben verwenden zu dürfen.

**Karte 5:**  
Verbreitung von *Cicadivetta tibialis* (PANZER 1788) in Österreich und angrenzenden Ländern.



## Zusammenfassung

In Österreich kommen fünf Singzikadenarten vor: Die Cicadidae *Lyrister plebeius* (SCOP.) und *Cicada orni* L. sowie die Tibicinidae *Tibicina haematodes* (SCOP.), *Cicadetta montana* (SCOP.) und *Cicadivetta tibialis* (PANZ.). Die Verbreitung dieser Arten in Österreich und in angrenzenden Regionen wird dargestellt. *C. montana* ist in Österreich sowohl nördlich als auch südlich der Zentralalpen weit verbreitet. *L. plebeius* konnte seit über 100 Jahren nicht mehr nachgewiesen werden. *T. haematodes* wird hier erstmal für das Burgenland gemeldet. Alle fünf Arten sind vorwiegend auf mehr oder minder reliktare Xerothermstandorte beschränkt. Arealexansionen konnten nicht beobachtet werden.



**Foto 5:**  
*Cicadivetta tibialis* (PANZ.) ♂

## Literatur

- CASTELLANI O. (1952): Contributo alla conoscenza della fauna emitterologica d' Italia. Hemiptera Homoptera. — Boll. Ass. romana Entomol., Roma **7**: 15-16.
- BOULARD M. (1995): Postures de cymbalisation, cymbalisations et cartes d'identité acoustique des cigales. 1.-Généralités et espèces méditerranéennes (Homoptera Cicadoidea). — Ephe, Biol. Evol. Insectes **7/8**: 1-72.
- DALLA TORRE K.W. (1913): Systematisches Verzeichnis der Cicaden Tirols. — Entomol. Jahrb., Leipzig **22**: 148-153.
- HAMANN H.H. (1960): Der Mönchgraben vor dem Bau der Autobahn. — Naturk. Jahrb. Stadt Linz **6**: 113-244.
- HANDEL-MAZETTI H.V. (1964): Naturwissenschaftliches vom Tschirgantgebirge bei Imst in Tirol. — Jb. V. Schutz Alpenpflanzen, München **29**: 18-25.
- HÖLZEL E. (1965): Neues über Hemiptera-Homoptera (Zikaden) aus Kärnten. — Carinthia II, Klagenfurt **155**: 115-126.
- HOFMÄNNER B. (1924): Die Hemipterenfauna des schweizerischen Nationalparks (Heteropteren und Zikaden). — Denkschr. schweiz. naturf. Ges. **60**: 1-89.
- HOLZINGER W.E. (1995): Bemerkenswerte Zikadenfunde aus Österreich, 2. Teil (Ins.: Homoptera, Auchenorrhyncha). — Linzer biol. Beitr. **27**: 1123-1127.
- HOLZINGER W.E. (1996a): Kritisches Verzeichnis der Zikaden Österreichs (Ins.: Homoptera, Auchenorrhyncha). — Carinthia II, Klagenfurt **186/106**: 501-517.
- HOLZINGER W.E. (1996b): Die Zikadenfauna wärmeliebender Eichenwälder Ostösterreichs (Insecta: Homoptera, Auchenorrhyncha). — Mitt. naturw. Ver. Steiermark **126**: 169-187.
- HOLZINGER W.E., FRÖHLICH W., GÜNTERT H., LAUTERER P., NICKEL H., OROSZ A., SCHEDL W. & R. REMANE (1997): Vorläufiges Verzeichnis der Zikaden Mitteleuropas (Insecta: Auchenorrhyncha). — Beitr. z. Zikadenkunde **1**: 43-62.
- HOLZINGER W.E. (1999): Rote Listen der Zikaden Kärntens (Insecta: Auchenorrhyncha). — Naturschutz in Kärnten **15**: 425-450.
- JANETSCHEK H. (1967): Plaudereien eines Zoologen über das Kaisergebirge. — Festschr. Hauptvers. ÖAV in Kufstein, p.47-50.
- JAUS J. (1934): Faunistisch-ökologische Studien im Anningergebiet, mit besonderer Berücksichtigung der xerothermen Formen. — Zool. Jahrb. Syst. **66**: 291-362.
- KALTENBACH A., STEINER H. & L. ASCHENBRENNER (1972): Die Tierwelt der Trockenlandschaft. — In: Naturgeschichte Wiens Bd. II: 447-494.
- KOERZER A. (1938): *Cicadetta megerlei* FIEB. in Südbayern (Rhynch.). — Mitt. Münchn. ent. Ges. **28**: 6-7.
- KOFLER A. (1971): Zum Vorkommen von Bergzikade und Holzbiene in Osttirol. — Osttiroler Heimatblätter, Lienz **39(1)**: p.4.
- KÜHNELT W. (1949): Die Landtierwelt, mit besonderer Berücksichtigung des Lunzer Gebietes. — In: Das Ybbstal, Wien I: 90-154.
- KÜHNELT W. (1962): Die Tierwelt in Steiermark. — Mitt.- naturw. V. Steiermark **92**: 47-72.
- LÄMMERMAYR L. & M. HOFFER (1922): Steiermark. — Junk's Natur-Führer, Berlin, 405 pp.
- LÖW P. (1886): Homoptera, Zirpen oder Zikaden. — In: BECKER M.A., Hernstein-Niederösterreich, Bd. III: 496-499.
- MADER L. (1922): Das Insektenleben Österreichs. — Wien, 216 pp.
- MAYR M. (1879): Rhynchota Tirolensis. II. Hemiptera homoptera (Cicadinen). — Ber. naturw.-mediz. V. Innsbruck **10**: 79-101.
- MOOSBRUGGER J. (1946): Die Zikadenfauna von Vorarlberg. — Zentralbl. Gesamtgeb. Entomol., Klagenfurt **1**: 65-75.
- PROHASKA K. (1923): Beitrag zur Kenntnis der Hemipteren Kärntens. — Carinthia II, Klagenfurt **232/233**: 32-101.
- RESSL F. (1963): Auswirkungen des Winters 1962/63 auf die Tierwelt. (Bericht aus dem Verwaltungsbezirk Scheibbs, NÖ.). — Jahrb. österr. Arbeitskreis f. Wildtierforsch., Graz **1962/63**: 175-177.
- SABRANSKY H. (1912): Beiträge zur Kenntnis der Hemipterenfauna Steiermarks. — Mitt. naturw. V. Steiermark, Graz **48**: 308-318.
- SCHEDL W. (1973): Zur Verbreitung, Bionomie und Ökologie der Singzikaden (Homoptera: Auchenorrhyncha, Cicadidae) der Ostalpen und ihrer benachbarten Gebiete. — Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck **60**: 79-94.
- SCHEDL W. (1980): Singzikade - Anzeiger von Wärmegegenden. — Natur u. Land, Salzburg **66**: 87-89.
- SCHEDL W. (1994): Rote Liste der gefährdeten Sing- und Buckelzikaden (Cicadidae, Tibicinidae und Membracidae) Südtirols. — In: Rote Liste gefährdeter Tierarten Südtirols. Bozen, p. 308-311.
- SCHEDL W. (2000): Taxonomie, Biologie und Verbreitung der Singzikaden Mitteleuropas (Insecta: Homoptera: Cicadidae et Tibicinidae). — Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck **87**: 257-271.
- SCHÖNITZER K. & U. OESTERLING (1998): Die bayerischen Zikaden der Zoologischen Staatssammlung München, ein Beitrag zur Faunistik der Homoptera Teil 1: Cixidae, Delphacidae, Issidae, Tettigometridae, Cicadidae, Cercopidae, Membracidae. — Nachr.bl. bayer. Ent., München **47**: 30-36.
- SCHUSTER R. (1961): Über das Vorkommen der Singzikade *Cicadetta montana* Scop. in der Steiermark. — Mitt. naturw. V. Steiermark, Graz **91**: 163-164.
- SCHUSTER R. (1964): Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark (X). — Mitt. naturw. V. Steiermark, Graz **94**: 134-135.



- Soós A. (1956): Revision und Ergänzungen zum Homopteren-Teil des Werkes „Fauna Regni Hungarii“ III. — Folia ent. hung., Budapest **IX** (Nr.14): 411-421.
- STROBL G. (1900): Steierische Hemipteren. — Mitt. naturw. Ver. Steiermark **36**: 170-224.
- THALER K. & W. SCHEDL (1992): Zoologische Bestandserhebung in der Föhrenlandschaft des Ötztal-Eingangs (1991). Terrestrische Wirbellose (Arthropoda-Gliedertiere). — Faunenerhebung i. Auftrag des Amtes der Tiroler Landesregierung, Abt. Umweltschutz, Innsbruck, 39 pp.+ 19 pp. Anhang.
- THEN F. & F. LÖW (1886): Katalog der österreichischen Cicadinen. — Progr. Theres. Akad. Ober-Gymnasium, Wien, 59 pp.
- WAGNER W. & H. FRANZ (1961): Auchenorrhyncha (Zikaden). — In: FRANZ H.: Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck Bd. **II**: 74-158.
- WERNER F. (1927): Zur Kenntnis der Fauna einer xerothermischen Lokalität in Niederösterreich (unteres Kamptal). — Ztsch. Morph. Ökol. Tiere **9**: 1-96.

**Anschrift des Verfassers:**

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang SCHEDL,  
Institut für Zoologie und Limnologie,  
Universität Innsbruck,  
Techniker-Str. 25,  
A-6020 Innsbruck, Österreich.